

Duphalyte

Steril Enjeksiyonluk Çözelti

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

Vitamin- Amino asit- Elektrolit-Şeker



FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Duphalyte vitamin, elektrolit, amino asit ve dekstrozdaki ibaret steril izotonik bir çözüldür. Duphalyte'daki amino asitler eritrositlerin şekillenmesi ile hormon ve antikorların nakli için gereken kan proteinlerinin sentezlenmesindeki yapı taşları olarak ortamda bulunurlar. Duphalyte enerji sağlayabilmek için dekstroz vücut tuzlarını ikame edebilmek için elektrolit ve enzim şekillenmesini sağlayabilmek için B vitaminleri kapsar. Bileşik, bozulmuş olan metabolizmanın normale dönmesine yardımcı olur.

KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR

Hayvanlarda sıvı kaybı, elektrolit dengesizliği ve hipoproteinemide kullanılıp, iştahsızlık, şiddetli ishal, ameliyat, kan kaybı, aşırı terleme, vasküler şok, bitkinlik, kilo kaybı, kusma, ateş, sindirim sisteminin yangısı, enterit ve nekroz devresinde destekleyici olarak uygulanır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Uygulama Yolu:

Atlar: Sadece yavaş intravenöz enjeksiyon

İnek ve domozlar: Yavaş intravenöz, intraperitoneal yada subkutan enjeksiyon

Köpek ve kediler: Yavaş intravenöz yada subkutan enjeksiyon

1 günlük tavuklar: Subkutan enjeksiyon

Dozaj:

At, sığır ve domozlar: Max. 100ml/50kg vücut ağırlığına

Tay, buzağı ve domuz yavruları: Max. 30ml/5kg vücut ağırlığına

Köpek ve kediler: Max. 50ml/5kg vücut ağırlığına

1 günlük civcivler: 0.5-1.0 ml/civciv

HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL KLİNİK BİLGİLER/UYARILAR

Intravenöz enjeksiyonlar çok yavaş yapılmalıdır. Aseptik şartlara uyulmalıdır.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

Önerilen kullanım şekli ve dozda herhangi bir istenmeyen etkisi yoktur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

GİDALARDAKİ İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): 0 gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Ürünün içeriklerinden herhangi birine bilinen duyarlılığı olan hayvanlarda kullanmayınız.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Ürünün içeriklerinden herhangi birine bilinen duyarlılığı olan şahıslar ürünle temastan kaçınmalıdır.

Uygulama esnasında kazara ürün ile enjekte olan şahıslar için derhal doktora başvurulmalı ve doktor ürünün tabiatı konusunda bilgilendirilmelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Serin (+2°C - +20°C), karanlık bir yerde saklanırsa açılmamış şişeler son kullanma tarihine kadar kullanılabilir. Açıldıktan sonra 28 gün stabilitesini korur. Raf ömrü 36 aydır. Dondurmayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

500 ml.lik polipropilen şişelerde satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesiyle veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır. (VHR)