

zoetis

Clostridium chauvoei-septicum-haemolyticum-novyi-sordellii-perfringens Tip C & D Bakterin-Toksoid

Sadece Veteriner Kullanım İçindir



UltraChoice™ 8

ULTRACHOICE™ 8

Sadece Veteriner Kullanım İçindir

Kompozisyonu: *Clostridium chauvoei*, *Cl. septicum*, *Cl. haemolyticum*, *Cl. novyi*, *Cl. sordellii*, ve *Cl. perfringens* Tip C ve D'nin inaktive edilmiş, standard kültürlerini ve adjuvant olarak Stimugen™ ve koruyucu madde olarak formalin içermektedir.

Endikasyonlar: Sağlıklı sığır ve koyunda *Cl. chauvoei* tarafından oluşturulan yanıkara, *Cl. septicum* tarafından oluşturulan malignan ödem, *Cl. haemolyticum* tarafından oluşturulan basiller haemoglobinüri, *Cl. novyi* tarafından oluşturulan infeksiyöz nekrotik hepatitis, *Cl. sordellii* tarafından oluşturulan gazlı gangren ve *Cl. perfringens* Tip B, C ve D tarafından oluşturulan enterotoksemi ve enteritis'e karşı korunmada kullanılır. *Cl. perfringens* Tip B'ye karşı bağışıklık Tip C'nin beta ve Tip D'nin epsilon toksoidleri ile sağlanmaktadır.

Uygulama ve dozaj: İyice çalkalayın.

Sığır: Aseptik olarak deri altı yolla 2 ml uygulanır. Sağlıklı sığırlara 4-6 hafta arayla 2 doz uygulanmalıdır.

Koyun: Aseptik olarak boyun bölgesinden deri altı yolla 1 ml uygulanır. Bunu 4-6 hafta sonra ikinci doz izlemelidir.

Tüm aşılamalarda olduğu gibi, aşılama sonrası enjeksiyon bölgesindeki doku hasarını önlemek için deri altı uygulama önerilmektedir. *Cl. haemolyticum* için etkene tekrar maruz kalması söz konusu olan hayvanlara her 6 ay bir doz uygulanmalıdır. Her sene tek doz tekrar aşılama tavsiye edilir.

Uyarılar: İyi hayvan bakımı ve sürü sağlık idaresi uygulamaları yapılmalıdır. Kullanılmaya başlanan aşının tamamı tüketilmelidir.

Kontrendikasyonları: Sağlıklı olmayan hayvanlar aşılanmamalıdır.

Bu aşının etkili olduğu sağlıklı hayvanlarda gösterilmiştir. Hayvanlarda infeksiyöz bir hastalık inkübasyon döneminde ise, yetersiz beslenme ya da paraziter infeksiyon söz konusu ise, nakliye ya da çevresel şartlar yüzünden stres altında ve immunosupresyona uğramış iseler ya da aşılamaya önerildiği gibi uygulanmamış ise yeterli bağışıklık yanıtı oluşmayabilir.

Gebe ve laktasyondaki hayvanlarda kullanım: Gebelik ve laktasyon dönemindeki hayvanlarda güvenliliği ile ilgili çalışmalar yapılmamıştır.

İstenmeyen etkileri: Aşılama sonrası uygulama bölgesinde geçici şişkinlikler oluşabilir. Diğer aşılarda kullanımında olduğu gibi, kullanım sonrası anafaktik şok meydana gelebilir. Spesifik antitod olarak epinefrin önerilir. Uygun destekleyici tedavi bunu izlemelidir.

Saklama koşulları: 2-7°C'ler arasında saklanmalıdır. Dondurulmamalıdır. Şişe bir kez açıldığında içeriğinin tamamı kullanılmalıdır. Işı ve ıskık kaynaklarından uzak bir ortamda tutulmalıdır.

Diğer ürünlerle birlikte kullanım: Bu aşının başka bir ürünle birlikte kullanımının ürünün güvenliği ve etkinliğine etkisine dair bir bilgi mevcut değildir. Diğer aşı ve immunolojik ürünlerle karıştırılmamalıdır.

Formu: *Clostridium chauvoei*, *Cl. septicum*, *Cl. haemolyticum*, *Cl. novyi*, *Cl. sordellii*, ve *Cl. perfringens* Tip C ve D'nin inaktive edilmiş, standard kültürlerini ve adjuvant olarak Stimugen™ ve koruyucu madde olarak formalin içermektedir.

Uygulama ve dozaj: Sığır: Aseptik olarak deri altı yolla 2 ml uygulanır. Sağlıklı sığırlara 4-6 hafta arayla 2 doz uygulanmalıdır. Koyun: Aseptik olarak boyun bölgesinden deri altı yolla 1 ml uygulanır. Bunu 4-6 hafta sonra ikinci doz izlemelidir.

Uyarılar: Sadece sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır. Diğer hastalıklardan etkilenebilecek olan ya da zayıf hayvanlar aşılanmamalıdır. Kesimden 21 gün önce hayvanlar aşılanmamalıdır.

Gebe ve laktasyondaki hayvanlarda kullanım: Gebelik ve laktasyon dönemindeki hayvanlarda güvenliliği ile ilgili çalışmalar yapılmamıştır.

Saklama koşulları: 2-7°C'ler arasında saklanmalıdır.

Dondurulmamalıdır. Kullanılmamış ürünler ve kullanım sonrası boş şişeler çevreyi kontamine etmeyecek şekilde imha edilmelidir.

Pazarlama İzni Sahibi Adı ve Adresi: Zoetis Hayvan Sağlığı Ltd. Şti., Buyaka İki Sitesi, Kule 2, 34771, Ümraniye-İstanbul
Üretim Yeri: Zoetis Inc., Lincoln, Nebraska, ABD
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Pazarlama İzni Tarihi ve No: 13.12.2010 / 047037
ABD Veteriner Lisans No. 190

14160900

Yasal arınma süresi: Kesimden 21 gün önce hayvanlar aşılanmamalıdır.

Raf ömrü: 24 aydır.

Ambalaj şekli: 20 ml'lik (10 sığır dozu/20 koyun dozu) ve 100 ml'lik (50 sığır dozu/100 koyun dozu) şişelerde sunulmuştur.

İmha şartları: Kullanılmamış ürünler ve kullanım sonrası boş şişeler çevreyi kontamine etmeyecek şekilde imha edilmelidir.

Pazarlama İzni Sahibi Adı ve Adresi: Zoetis Hayvan Sağlığı Ltd. Şti., Buyaka İki Sitesi, Kule 2, 34771, Ümraniye-İstanbul

Üretim Yeri: Zoetis Inc., Lincoln, Nebraska, ABD

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Pazarlama İzni Tarihi ve No: 13.12.2010 / 047037

ABD Veteriner Lisans No. 190

5065-4

14160900