

50 siğir dozu  
100 koyun dozu

250 mL

# Clostridium chauvoei- septicum- haemolyticum- novyi-sordellii- perfringens Tip C & D Bakterin-Toksoid

Sadece Veteriner Kullanım İçindir



Ultrabac® 8

zoetis

ULTRABAC® 8

Sadece Veteriner Kullanım İçindir

**Kompozisyonu:** *Clostridium chauvoei*, *Cl. septicum*, *Cl. haemolyticum*, *Cl. novyi*, *Cl. sordellii* ve *Cl. perfringens* Tip C ve D'nin inaktive edilmiş, standart kültürlerini, adjuvant olarak alüminyum hidroksit ve koruyucu madde olarak formalin içermektedir.

**Endikasyonlar:** Sağlıklı siğir ve koyunda *Cl. chauvoei* tarafından oluşturulan yanıkara, *Cl. septicum* tarafından oluşturulan malignan ödem, *Cl. haemolyticum* tarafından oluşturulan basiller haemoglobüni, *Cl. novyi* tarafından oluşturulan enfeksiyöz nekrotik hepatitis, *Cl. sordellii* tarafından oluşturulan gazlı gangren ve *Cl. perfringens* Tip B, C ve D tarafından oluşturulan enterotoksemi ve enteritise karşı korunmada kullanılır. *Cl. perfringens* Tip B'ye karşı bağışıklık Tip C'nin beta ve Tip D'nin epsilon toksoidleri ile sağlanmaktadır.

**Uygulama ve dozaj:** Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır. Aseptik şartlar altında subkutan yolla ineklere 5 mL ve koyunlara 2 ½ mL enjekte edilir ve dört (4) ile altı (6) hafta sonra aşı tekrarlanır. *C. haemolyticum* için, etkene yeniden maruz kalabilecek hayvanlarda doz her beş (5) ila altı (6) ayda bir tekrarlanır. Yüksek düzeyde bağışıklık sağlamak için aşı her yıl tekrarlanmalıdır.

**Uyarılar:** İyi hayvan bakımı ve sürü sağlık idaresi uygulamaları yapılmalıdır. Kullanılmaya başlanan aşının tamamı tüketilmelidir.

**Kontrendikasyonları:** Sağlıklı olmayan hayvanlar aşılanmamalıdır. Bu aşının etkili olduğu sağlıklı hayvanlarda gösterilmiştir. Hayvanlarda enfeksiyöz bir hastalık inkübasyon döneminde ise, yetersiz beslenme ya da paraziter enfeksiyon söz konusu ise, nakliye ya da çevresel şartlar yüzünden stres altında ve immunosupresyona uğramış iseler ya da aşılama önerildiği gibi uygulanmamış ise yeterli bağışıklık yanıtı oluşmayabilir.

**İstenmeyen etkileri:** Aşılama sonrası uygulama bölgesinde geçici şişkinlikler oluşabilir. Diğer aşıların kullanımında olduğu gibi, kullanım sonrası anafaktik şok meydana gelebilir. Spesifik antitod olarak epinefrin önerilir. Uygun destekleyici tedavi bunu izlemelidir.

**Saklama koşulları:** 2-7°C'ler arasında saklanmalıdır. Dondurulmamalıdır. Şişe bir kez açıldığında içeriğin tamamı kullanılmalıdır. Işı ve ışık kaynaklarından uzak bir ortamda tutulmalıdır.

**Formu:** *Clostridium chauvoei*, *Cl. septicum*, *Cl. haemolyticum*, *Cl. novyi*, *Cl. sordellii*, ve *Cl. perfringens* Tip C ve D'nin inaktive edilmiş, standart kültürlerini, adjuvant olarak alüminyum hidroksit ve koruyucu madde olarak formalin içermektedir.

**Uygulama ve dozaj:** Aseptik olarak deri altı yolla siğirlere 5 mL ve koyunlara 2 ½ mL uygulanır ve dört (4) ile altı (6) hafta sonra aşı tekrarlanır. *C. haemolyticum* için, etkene yeniden maruz kalabilecek hayvanlarda doz her beş (5) ila altı (6) ayda bir tekrarlanır.

**Uyarılar:** Sadece sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır. Diğer hastalıklardan etkilenmekte olan ya da zayıf hayvanlar aşılanmamalıdır. Kesimden 21 gün önce hayvanlar aşılanmamalıdır.

**Saklama koşulları:** 2-7°C'ler arasında saklanmalıdır. Dondurulmamalıdır.

**İmha şartları:** Kullanılmamış ürünler ve kullanım sonrası boş şişeler çevreyi kontamine etmeyecek şekilde imha edilmelidir.

**Pazarlama İzni Sahibi Adı ve Adresi:** Zoetis Hayvan Sağlığı Ltd. Şti., Buyaka İkinci Sitesi, Kule 2, 34771, Ümraniye-İstanbul

**Üretim Yeri:** Zoetis Inc., Lincoln, Nebraska, ABD

**T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Pazarlama İzni Tarih ve No:** 13.12.2010 - 047036

**Diğer ürünlerle birlikte kullanım:** Bu aşının başka bir ürünle birlikte kullanımının ürünün güvenliği ve etkinliğine etkisine dair bilgi mevcut değildir.

Diğer aşı ve immunolojik ürünlerle karıştırılmamalıdır. **Yasal arınma süresi:** Kesimden 21 gün önce hayvanlar aşılanmamalıdır.

**Raf ömrü:** 30 aydır.

**Ambalaj şekli:** 50 ve 250 ml'lik şişelerde sunulmuştur. 50 ml'lik ambalaj 20 koyun dozu veya 10 siğir dozu; 250 ml'lik ambalaj 100 koyun dozu veya 50 siğir dozu içerir.

**İmha şartları:** Kullanılmamış ürünler ve kullanım sonrası boş şişeler çevreyi kontamine etmeyecek şekilde imha edilmelidir.

**Pazarlama İzni Sahibi Adı ve Adresi:** Zoetis Hayvan Sağlığı Ltd. Şti., Buyaka İkinci Sitesi, Kule 2, 34771, Ümraniye-İstanbul

**Üretim Yeri:** Zoetis Inc., Lincoln, Nebraska, ABD

**T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı**

**Pazarlama İzni Tarih ve No:** 13.12.2010 - 047036

ABD Veteriner Lisans No. 190

14161600

14161600