

500 ml
1000 Doz

POULVAC® Coryza ABC IC₃ Haemophilus paragallinarum bacterin



DİKKAT: Aşı karanlık bir yerde 2 ila 7 °C arasında saklanmalıdır. Aşı dondurulmamalıdır. Aşı uygulanmadan önce 22°C sıcaklığa getirilir ve iyice çalkalanır. Aşı kesim öncesi 42 güne dek kullanılmamalıdır. Aşı ilk açıldığında tamamı kullanılmalıdır.

UYARI: Kaza ile insana enjekte edilirse derhal tıbbi yardım istenmelidir.

BU ÜRÜN GERİ ALINMAZ.

ABD Veteriner Lisans No. 190

İzin Sahibi ve İthalatçı Firma: Zoetis Hayvan Sağlığı Ltd. Şti.,

Buyaka İki Sitesi, Kule 2, 34771, Ümraniye-İstanbul

Üretim Laboratuvarı: Zoetis Inc

2000 Rockford Road

Charles City, Iowa, ABD

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İthal Ön İzin Tarih ve No:
12.12.2011 - 041598

Sadece veteriner kullanım içindir.

zoetis

Poulvac Coryza ABC, Haemophilus paragallinarum serotip A, 083 suşu ($\geq 1 \times 10^8$ DCE/her doz için), Haemophilus paragallinarum serotip B, spross suşu ($\geq 1 \times 10^8$ DCE/her doz için) ve Haemophilus paragallinarum serotip C, modesto suşu ($\geq 1 \times 10^8$ DCE/her doz için) serovaryetelerini temsil eden suşların adjuvantlı inaktif kültürlerini içerir.

Haemophilus paragallinarum A, B ve C serovaryetelerinin neden olduğu klinik bulguların önlenmesi amacı ile sağlıklı piliçlerin aşılanması için kullanılır.

DOZ: Aseptik teknik kullanılarak 0.5ml (0.5cc) subkutan (aşağı ense bölgesine) veya kas içi enjekte edilir. 8 haftalık veya daha büyük sadece sağlıklı piliçler aşılanır. İlk aşılamadan en az 3 hafta sonra ve yumurtlama başlangıcından en az 4 hafta önce revaksinasyon yapılır.