

V.A. ChickVac™

Tenosynovitis Aşısı

Canlı liyofilize aşı

Sadece veteriner kullanımı içindir.

Sadece deri altı yolla 1-10 günlük civcivlerin aşılmasında kullanılır.

Kompozisyonu: Doz başına en az $10^{3.9}$ TCID₅₀ miktarında canlı Tenosynovitis Virüsü #1133 suşunu içeren modifiye, canlı, liyofilize bir aşıdır.

Endikasyonlar: V.A. ChickVac™ aşı 1 ila 10 günlük sağlıklı civcivlerin Tenosynovitis virüsünün neden olduğu viral artiritis'e karşı korunmasına yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Uygulamanın boyun bölgesinden deri altı yolla yapılması önerilir.

Kontrendikasyonlar: Yumurtlama zamanındaki tavukları aşılamayınız. Hasta hayvanlar aşılammalıdır.

Yasal arınma süresi: 21 gün

Diğer aşılarla ve ürünlerle etkileşimler: Bu ürün 1 günlük yaşta uygulandığında Marek Hastalığı Aşılarının etkinliğinde azalmaya neden olabilir.

Uygulama ve Dozaj:

1. Sadece Zoetis Hayvan Sağlığı seyrelticiyi kullanınız. Seyrelticiyi 27°C (80°F)'nin üzerindeki sıcaklıklarda muhafaza etmeyiniz.
2. 1 şişe seyreltici ile yalnızca 1 flakon aşıyı sulandırınız.
3. Alüminyum mührün ortasındaki kısmı dış halkasına zarar vermeden çıkartınız. Plastik tapayı alkol ile sterilize ediniz. Seyreltici kabının plastik tapasını da alkol ile sterilize ediniz.
4. Steril bir enjektör ve iğne kullanarak, seyreltici kabına ait tapadan içeri giriniz ve 3 ml (3 cc) seyrelticiyi çekiniz. Sonra iğneyi aşı flakonunun tapasına batırıp, enjektörün içeriğini boşaltınız.
5. Enjektör ve iğneyi çıkartınız. Enjektörün pistonunu enjektör içerisine 2-3 ml hava alacak şekilde geriye çekiniz. Bu çok önemlidir.
6. İğneyi tekrar aşı flakonuna batırınız. Tapadan içeriye giriniz. Havayı flakonun içerisine boşaltınız (vakumu kırmak için).
7. Enjektör ve iğne hala yerinde iken, flakonu ters çevirip enjektörün pistonunu geriye doğru çekiniz ki tüm içerik (sulandırılmış aşı) flakondan enjektöre dolsun.
8. İğneyi seyreltici kabına (tapadan) batırınız ve enjektörün içeriğini seyrelticiye boşaltınız. Kabı nazikçe döndürünüz; böylece karışım homojen bir hale gelir. Aşı kullanılmaya hazırdır.
9. 20 ila 22 gauge, 3/8 ila 1/2 inç uzunlukta iğneler ile otomatik bir enjektör gereklidir. Tüm ekipmanın steril olduğundan emin olunuz. İğneleri sık sık değiştiriniz.
10. Her kuşu boynunun arka bölgesinden 0.2 ml aşı ile deri altı yoldan aşılayınız.
11. Aşığı sulandırdıktan sonra 1 flakondaki (1000 doz) tüm aşığı 1 saat içerisinde kullanınız. Aşığı ısı kaynaklarından uzak tutunuz. Direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Uyarılar

Kesimden önceki 21 gün içerisinde aşılama yapılmaz. Aşı şişesi ve kullanılmayan içerikler yakılarak imha edilmelidir. Bu ürün kullanma talimatında belirtilen şekilde saklanmalı, nakledilmeli ve uygulanmalıdır.

Saklama koşulları ve raf ömrü: 2-8°C arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır. Aşığı ısı kaynaklarından uzak tutunuz. Direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. İlk açıldığında içeriğin tamamı kullanılmalıdır. Aşığı sulandırdıktan sonra tüm aşı 1 saat içerisinde kullanılmalıdır. Raf ömrü 24 aydır.

Toplam doz: Alüminyum başlık ve tapalar ile kapatılmış tip I cam şişelerde 10 x 1000 doz halinde 10 x 200 ml'lik steril seyreltici ile birlikte sunulmuştur.

İmha koşulları: Aşı kabı ve kullanılmayan tüm içerik yakılarak imha edilmelidir.

ABD Veteriner Lisans No. 190

zoetis

Pazarlama İzni Sahibi ve İthalatçı Firma: Zoetis Hayvan Sağlığı Ltd. Şti., Buyaka İki Sitesi, Kule 2, 34771, Ümraniye-İstanbul

Üretim Laboratuvarı: Zoetis Inc 2000 Rockford Road, Charles City, Iowa, ABD

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Pazarlama İzni Tarihi ve No:

13.09.2012-P-0029