

zoetis

10 siğir dozu 20 mL
20 koyun dozu

Clostridium perfringens Tip C & D Bakterin-Toksoid

Sadece Veteriner Kullanım İçindir

Ultrabac® CD



Formu: *Clostridium perfringens* Tip C ve D'nin öldürülmüş, standardize edilmiş kültürlerini, adjuvant olarak alüminyum hidroksit ve koruyucu madde olarak formalin içeren bakterin-toksoid bir aşıdır.

Uygulama ve dozaj: Uygulama öncesi iyice çalkalanmalıdır. Siğırlara aseptik olarak deri altı yolla 2 ml uygulanır ve 4–6 hafta sonra uygulama tekrarlanır. Koyunlara aseptik olarak 1 ml uygulanır, 4–6 hafta sonra uygulama tekrarlanır. Siğir ve koyunlarda her yıl 1 doz olarak aşının tekrarı önerilir. İyi hayvan bakımı ve sürü sağlık idaresi uygulamaları yapılmalıdır.

Uyarılar: Sadece sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır. Diğer hastalıklardan etkilenmekte olan ya da zayıf hayvanlar aşılanmamalıdır. Kesimden 21 gün önce hayvanlar aşılanmamalıdır.

Saklama koşulları: 2–7°C'ler arasında saklanmalıdır. Dondurulmamalıdır.

Pazarlama İzni Sahibi Adı ve Adresi: Zoetis Hayvan Sağlığı Ltd. Şti., Buyaka İki Sitesi, Kule 2, 34771, Ümraniye-İstanbul

Üretim Yeri: Zoetis Inc., Lincoln, Nebraska, ABD

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİNİ TARİHİ VE NO: 08.04.2005 - 008658

ABD Veteriner Lisans No. 190

ULTRABAC® CD

Sadece Veteriner Kullanım İçindir

Kompozisyonu: *Clostridium perfringens* Tip C ve D'nin öldürülmüş, standardize edilmiş kültürlerini, adjuvant olarak alüminyum hidroksit ve koruyucu madde olarak formalin içeren bakterin-toksoid bir aşıdır.

Endikasyonlar: Sağlıklı siğir ve koyunlarda *Cl. perfringens* Tip B, C ve D tarafından oluşturulan enterotoksemi ve enteritisin önlenmesine yardımcı olarak kullanılır. *Cl. perfringens* Tip B'ye karşı bağışıklık Tip C'nin beta ve Tip D'nin epsilon toksoidleri ile sağlanmaktadır.

Uygulama ve dozaj: Uygulama öncesi iyice çalkalanmalıdır. Siğırlara aseptik olarak deri altı yolla 2 ml uygulanır ve 4–6 hafta sonra uygulama tekrarlanır. Koyunlara aseptik olarak 1 ml uygulanır, 4–6 hafta sonra uygulama tekrarlanır.

Siğir ve koyunlarda her yıl 1 doz olarak aşının tekrarı önerilir.

Uyarılar: İyi hayvan bakımı ve sürü sağlık idaresi uygulamaları yapılmalıdır. Kullanılmaya başlanan aşının tamamı tüketilmelidir.

Kontrendikasyonları: Sağlıklı olmayan hayvanlar aşılanmamalıdır.

Bu aşının etkili olduğu sağlıklı hayvanlarda gösterilmiştir. Hayvanlarda enfeksiyöz bir hastalık inkübasyon döneminde ise, yetersiz beslenme ya da paraziter enfeksiyon söz konusu ise, nakliye ya da çevresel şartlar yüzünden stres altında ve immunosupresyona uğramış iseler ya da aşılama önerildiği gibi uygulanmamış ise yeterli bağışıklık yanıtı oluşmayabilir.

İstenmeyen etkileri: Aşılama sonrası uygulama bölgesinde geçici şişkinlikler oluşabilir. Diğer aşılama kullanımında olduğu gibi, kullanım sonrası anafaktik şok meydana gelebilir. Spesifik antitod olarak epinefrin önerilir. Uygun destekleyici tedavi bunu izlemelidir.

Saklama koşulları 2–7°C'ler arasında saklanmalıdır. Isı ve ışık kaynaklarından uzak bir ortamda tutulmalıdır. Dondurulmamalıdır.

Diğer ürünlerle birlikte kullanım: Bu aşının başka bir ürünle birlikte kullanımının, ürünün güvenliği ve

etkinliğine etkisine dair bir bilgi mevcut değildir. Diğer aşı ve immunolojik ürünlerle karıştırılmamalıdır.

Yasal arınma süresi: 21 gündür.

Raf ömrü: 30 aydır.

Ambalaj şekli: 20 ve 100 ml'lik plastik şişelerde sunulmuştur. 20 ml'lik ambalaj 20 koyun dozu veya 10 siğir dozu; 100 ml'lik ambalaj 100 koyun dozu veya 50 siğir dozu içerir.

İmha şartları: Kullanılmamış ürünler ve kullanım sonrası boş şişeler çevreyi kontamine etmeyecek şekilde imha edilmelidir.

Pazarlama İzni Sahibi Adı ve Adresi:

Zoetis Hayvan Sağlığı Ltd. Şti., Buyaka İki Sitesi, Kule 2, 34771, Ümraniye-İstanbul

Üretim Yeri: Zoetis Inc., Lincoln, Nebraska, ABD

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİNİ TARİHİ VE NO: 08.04.2005 - 008658

ABD Veteriner Lisans No. 190

5451-2