

Sadece Hayvan Saęlıęında Kullanılır

Lincomix® 44 Premix

Veteriner İlaçlı Premiks/Oral Toz
Veteriner Sistemik Antibakteriyel



zoetis

25kg



BİLEŞİMİ

Her kilogram;
Aktif Madde : 44 g linkomisine eşdeęer linkomisin hidroklorür monohidrat,
Yardımcı madde : İnce sıvı parafin 10g
Soya unu q.s. ad 1.000g içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Lincomix® 44 Veteriner İlaçlı Premix, linkomisin hidroklorür aktif maddesi içeren ilaçlı yem için premixtir. Linkomisin, Streptomyces lincolnensis'ten elde edilen; linkozamidler sınıfına ait bir antibiyotiktir. 50S ribozomal alt ünitelere etkiyerek ribozomal protein sentezini inhibe eder.

Linkomisinin antibakteriyel aktivitesi özellikle gram-pozitif bakteriler ve anaerobik bakteriler üzerinedir. Bacillus sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Staphylococcus sp., Streptococcus sp. (Enterococcus spp hariç), Campylobacter sp., Actinomyces sp., Bacteroides sp. (Bac. fragilis de dahil), Clostridium perfringens (dięer Clostridium sp hariç), Fusobacterium sp., anaerobik koklar duyarlıdır. Bařta Klebsiella sp., Salmonella sp., Pseudomonas sp., Pasteurella sp. olmak üzere gram negatif bakteriler, Nocardia sp., Mycobacterium sp. ise dirençlidir.

Uygulamayı takiben linkomisinin yaklaşık % 70' i plazma proteinlerine bağlanarak taşınır ve özellikle mukus içinde çok yüksek penetrasyon deęerlerine ulaşır, kemik doku içindeki dağılımı iyi düzeydedir. Yangı olmadığı durumlarda dahi pleural ve peritoneal sıvı içine diffuze olur. Bununla beraber linkomisin; özellikle polimorfonükleer nötrofillerle taşınarak enfeksiyon bölgesinde yoğunlaşır. Uygulamayı takiben linkomisin, büyük oranda dışkı (%77) ve idrarla (%14) atılır.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

Lincomix® 44 Veteriner İlaçlı Premix, etçi tavuklarda duyarlı bakteriler tarafından oluşturulan Nekrotik enteritis'in tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Lincomix® 44 Veteriner İlaçlı Premix, kullanılmadan önce yemle iyice karıştırılmalıdır.

Nekrotik enteritis'in tedavisinde:

Hazırlanan ilaçlı yemin her tonunda 44 gram linkomisin bulunmalıdır. Bu amaçla, 1 kg Lincomix® 44 Veteriner İlaçlı Premix, 1 ton yeme katılarak istenen düzey elde edilmiş olur. Hazırlanan ilaçlı yemle sağaltım 7 gün süreyle sürdürülmelidir.

Karıştırma Talimatı:

Aktif maddenin sonuç yemde ideal dağılımını sağlamak amacıyla Lincomix® 44 Veteriner İlaçlı Premix'in (44g/kg) bir ön karışım yapıldıktan sonra sonuç yeme katılması daha uygun olur. Yukarıda belirtilen miktarlardaki Lincomix® 44 Veteriner İlaçlı Premix ile yemin az miktarı kullanılarak bir ön karışım yapıldıktan sonra bu ön karışım sonuç yeme katılmalıdır.

İlaçlı yemin üretimi sırasında iyi üretim kurallarına uyulmalıdır. Çapraz kontaminasyonu önlemek amacıyla, kullanımı takiben karıştırma ekipmanlarının gerekli temizleme işlemi yapılmalıdır.

İSTENMEYEN/ YAN ETKİLER

Lincomix® 44 Veteriner İlaçlı Premix'in önerilen dozlarda, hedef türler için yan etkisi yoktur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Kaolin, linkomisinin emilimini %90 oranında azaltır. Linkomisin ile eritromisin ve fenikoller arasında ilaç antagonizma görülebileceğinden, eritromisin ve fenikoller ile simultane kullanımından sakınılmalıdır.

GİDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklar 2 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtası insan tüketimine sunulan tavuklarda kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLAR

Lincomix® 44 Veteriner İlaçlı Premix, hamster, tavşan, kobay, çinçilla, atlar ve geviş getiren hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Beklenmeyen bir etki görüldüğü taktirde veteriner hekime başvurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Uygulayıcının tozu solumaması için karıştırma sırasında bir yüz maskesi giymesi önerilir. Deri ile olan temastan kaçınılmalıdır. Deri ile temas olduğu taktirde eller ve bulaşık bölgeler bol suyla iyice yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 60 aydır. Oda ısısında (15-25°C) saklayınız. Açılmış paketler, kekleşmenin önüne geçmek amacıyla kuru bir ortamda ve ağız kapalı olarak saklanmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

5 ve 25 kg'lık alüminyum folyo torbalarda satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesiyle eczanelerde ve veteriner muayenehanelerinde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 19.09.2007

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİH-NO: 13.05.2003 8/798

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ: Zoetis Hayvan Saęlıęı Ltd. Şti. Buyaka İki Sitesi, Kule 2, 34771, Ümraniye-İstanbul

ÜRETİM YERİNİN ADI VE ADRESİ: Zoetis Suzhou Manufacturing Co., Ltd. No:180, Zhu Yuan Road, New District, Suzhou 215011 - Çin

Seri no:

Üretim ta.:

Son kul. ta.:

Tavsiye Edilen Per. Sa. Fi., KDV Dahil:

A73248-1

VET

zoetis