

14022900

**Sadece Veteriner Kullanım İçindir.**  
**LymeVax®**



**KOMPOZİSYONU:**

*Borrelia burgdorferi* bakterin içerir.

1 mL dozda:

*Borrelia burgdorferi*

RP $\geq$ 1.0 çıkış dozu

EMA 31

0.01 mL

Neocryl

0.03 mL

Thimerosal Solüsyonu %5

0.001 mL

MEM veya Dengelenmiş Tuz Solüsyonu

1.0 mL'ye tamamlayacak kadar

Toplam

1.0 mL

Koruyucu olarak thimerosal eklenmiştir.

**ENDİKASYONLARI:**

*Borrelia burgdorferi*'nin neden olduğu hastalıkların önlenmesi amacıyla 9 haftalık veya daha büyük sağlıklı köpeklerin aşılmasında kullanılır.

**KONTRENDİKASYONLARI:**

Yok.

**UYGULAMA VE DOZAJ:**

Aseptik teknik kullanılarak köpeklere derialtı yolla 1 mL doz enjekte edilir. İkinci doz 2 – 3 hafta sonra yapılmalıdır. Her sene tek dozluk tekrar aşı yapılması önerilir.

**UYARILAR:**

Hedef türler için özel uyarı:

Aşı uygulanmasından sonra, enjeksiyon bölgesinde geçici lokal reaksiyonlar meydana gelebilir. Anafaktik reaksiyon şekillenirse, epinefrin uygulayınız.

Kullanımda dikkat edilecek özel durumlar:

Aşı şişesi iyice çalkalanmalı ve içerik hemen enjekte edilmelidir.

**YAN ETKİLER:**

Anafaktik reaksiyon şekillenirse, antidot olarak epinefrin uygulayınız.

**YASAL ARINMA SÜRESİ:**

Uygulanabilir değil.

**SAKLAMA KOŞULLARI:**

2° - 7°C'de (35° - 45°F) karanlıkta saklayınız.

DONDURMAYINIZ. İYİCE ÇALKALAYINIZ.

**AMBALAJ ŞEKLİ:**

50x1 ml (1 doz) ve 10x10 ml (10 doz) cam veya plastik kaplarda

**İMHA ŞARTLARI:**

Veteriner tıbbi ürünlerinden kullanılmayan veya atık maddeler yerel kanunlara göre elden çıkarılır.

**T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİNİ**

**TARİHİ VE NO:** 07.02.2012-04254

ABD Veteriner Lisans No. 190

**zoetis**

**PAZARLAMA İZİNİ SAHİBİ ADI VE ADRESİ:**

Zoetis Hayvan Sağlığı Ltd. Şti.,  
Buyaka İki Sitesi, Kule 2, 34771, Ümraniye-İstanbul

**ÜRETİM LABORATUVARI:**

Zoetis Inc  
2000 Rockford Road  
Charles City, Iowa, ABD