

Kanatlı Çiçek Hastalığı Aşısı

Canlı virüs

Poxine®

Sadece veteriner kullanım içindir.

Aşağıdaki tüm önerileri dikkatlice okuyunuz.

Kanatlı çiçeği virüsü MS7 suşu ($\geq 10^{2.6}$ EID₅₀/her doz için) içeren Poxine'nin, çiçek enfeksiyonuna karşı 6 haftalık veya daha büyük sağlıklı piliçlere ve 8 haftalık veya daha büyük sağlıklı hindilere uygulanması önerilir.

Aşı 2 - 8 °C'ler arasında saklanır.

Kesimden 21 gün öncesine dek aşı uygulanmamalıdır.

Şişe ilk açıldığında tamamen kullanılmalıdır.

Aşı şişesi ve tüm kullanılmayan içerikler yakılmalıdır.

AŞILAMA ZAMANI

Piliçler: Poxine aşısı en az 6 haftalık piliçlere yumurta üretiminden en az 1 ay önce uygulanır. Bu aşı ayrıca, çiçek enfeksiyonunu önlemek amacıyla, 6 haftadan erken başka bir aşı uygulanmış ise, 12 haftalık yaştaki piliçlere tekrar aşılama (revaksinasyon) yönünden önerilir.

Hindiler: Hindilerde çiçek aşı uygulaması, hastalığın sıklığı ve yaygın özellik taşınması nedeniyle birçok bölgede önerilir. Hindi palazlarının, yetiştirildiği kümeslerden diğer bölümlere veya açık sahaya transfer edilirken (genellikle 8 haftalık iken) aşılanmaları yaygın ve pratik bir işlemdir. Hindilerin pazara çıkarılmalarından önceki 8 hafta içinde aşılanmamaları önerilir.

KULLANMA TALİMATI

1. 1 şişe aşı 1 şişe dilüent ile eritilir.
2. Aşı ve dilüent şişelerinin alüminyum kapsülleri ve tapaları çıkarılır. Tapaların ve şişe içeriklerinin kontamine olmaması gerekir.
3. Dilüentin yaklaşık yarısı aşı şişesine boşaltılır. Tapa yerine konur ve şişedeki tüm içerik eriyinceye kadar şişe çalkalanır.
4. Tüm eriyen aşı içeriği, dilüent şişesindeki kalan dilüent içine boşaltılır. Dilüent şişesinin tapası yerine konur. Yavaşça karıştırılır. Aşı kullanıma hazır hale gelir.
5. Kanatlar tek tek tutulur ve kanat alt kısmı yukarı bakacak şekilde gerilir.
6. Aşı iğnesi aşı şişesinin içerisine daldırılır, her iki iğnenin ıslanması sağlanır. Aşı yüklü iğne, kanat zarına batırılır.
7. Aşının tüylere, kanatlarının başına veya derisine temas etmemesi gerekir (uygulama yeri hariç). Aşı kanat zarına batırılırken iğnenin kan damarı, kemik ve kanat kasına gelmesinden kaçınılması gerekir.

Aşı Reaksiyonu/ Kabuk Oluşumu

Aşılamadan 4 gün sonra uygulama yerinde şişkinliğe benzer normal reaksiyon görülür. Sonraki 5 gün içinde şişkinlik artar ve kabuk şekillenir. Reaksiyon görülmezse aşı tekrarlanır.

Önlemler:

Uygulama esnasında aşının direkt güneş ışığından veya aşırı sıcaktan korunması gerekir.

Sadece sağlıklı piliçler ve hindiler aşılanmalıdır.

Koruyucu olarak gentamisin içerir.

Uyarı:

Bu ürün talimat ve öneriler doğrultusunda saklanmalı ve uygulanmalıdır.

Bu aşının kullanımı yönünden uygulaması mümkün olan yerlerde yasalara bağlıdır.

List No: 6074: 10x1000 Doz

BU ÜRÜN GERİ ALINMAZ.

ABD Veteriner Lisans No. 190

zoetis

Pazarlama İzni Sahibi ve İthalatçı Firma:

Zoetis Hayvan Sağlığı Ltd. Şti., Buyaka İki Sitesi, Kule 2,
34771, Ümraniye-İstanbul

Üretim Laboratuvarı: Zoetis Inc

2000 Rockford Road

Charles City, Iowa, ABD

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Pazarlama İzni Tarihi ve No:

14.02.2012 - 5142