

Bursal Hastalık Aşısı

Canlı Virüs, Intermediate Plus

Bursine® Plus



Sadece veteriner kullanım içindir.
Aşağıdaki tüm önerileri dikkatlice okuyunuz.
Aşı 2 - 8 °C'ler arasında saklanır.
Kesimden 21 gün öncesine dek aşı uygulanmamalıdır.
Şişe ilk açıldığında tamamen kullanılmalıdır.
Aşı şişesi ve tüm kullanılmayan içerikler yakılmalıdır.

Uyarı: Sadece önceden gumboro hastalığı görülen ve izin verilen yerlerde kullanılır.
Koruyucu madde olarak gentamisin içerir.

Bursine Plus, bursal hastalığı virüsü (Serbest bırakma sırasındaki aşı titresi en az $10^{2.9}$ TCID₅₀ /doz. Son kullanma tarihine kadar aşı titresi en az $10^{2.4}$ TCID₅₀/doz) içeren canlı virüs aşısı olup, piliçlerde enfeksiyöz bursal hastalığın (IBD veya gumboro hastalığı) önlenmesi amacı ile kullanılır.

Bursine Plus, inaktif IBD aşısından önce damızlık yarkaların prime edilmesinde çok uygundur.

Enfeksiyöz bursal hastalığın önlenmesi amacı ile 7 günlük veya daha büyük sağlıklı piliçler içme suyu ile aşılanır.

İçme suyu kullanma talimatı:

Piliçler: İçme suyu ile 7 günlük veya daha büyük sağlıklı civcivler aşılanır.

Damızlıklar: İnaktif IBD aşısı için primer olarak kullanıldığında, Bursine Plus 6-8 haftalar arasında inaktif aşı öncesi içme suyu ile verilir.

1. Aşılamadan 4 saat önce içme suyu ile sağıtım veya sanitizer madde uygulanması kesilir. Aşılamadan 24 saat sonrasında kadar bu işlem sürdürülür.
2. Canlı virüs aşısı katılan içme suyu klorsuz olmalıdır.
3. Aynı anda kanatlıların 2/3'ünün içmesi için yeterli suluk sağlanır. Suluklar taze, temiz, klorsuz su ile fırçalanarak temizlenir ve suluklar kurumaya terk edilir.
4. Otomatik suluklar kapanır. Sadece aşılı su verilir. Aşılı su ilaçlama tankından verilmez.
5. Aşılamadan 2-4 saat önce içme suyu kesilir. Eğer ısı çok yüksek ise kanatlıları susuz bırakmayın.
6. Aşı şişesindeki kapsül çıkarılır.
7. Lastik tapa çıkarılır ve şişenin yarısı temiz, serin, klorsuz su ile doldurulur.
8. Tapa yeniden konur ve içerik eriyinceye kadar şişe çalkalanır.
9. Temiz bir kaba 2/3 oranında serin, temiz, klorsuz su konur. 28. 4 gr yağsız süt tozu 7.6 litre suya katılır. 1000 doz aşı için bu solüsyondan 3.8 - 7.6 litre kullanılır.
10. Eritilmiş aşı yağsız süt tozu bulunan solüsyona katılır ve iyice karıştırılır.
11. Son aşı suyunu temiz suluklara eşit olarak dağıtın. Sulukları doğrudan güneş ışığına maruz kalacak yerlere koymayın. Aşı suyunun tamamı tüketildikten sonra düzenli su dağıtımına devam edin.

Uyarı: Bu ürün talimatlar ve öneriler doğrultusunda saklanmalı, nakledilmeli ve uygulanmalıdır. Aşı sadece izin verilen durumlarda ve enfeksiyöz bursal hastalık görülen çiftliklerde uygulanır.

List No: 35753: 10 x 1000 Doz
55214: 10 x 2500 Doz
00964: 10 x 5000 Doz
72111: 10 x 10000 Doz

BU ÜRÜN GERİ ALINMAZ.

ABD Veteriner Lisans No. 190

zoetis

Pazarlama İzni Sahibi ve İthalatçı Firma: Zoetis Hayvan Sağlığı Ltd.Şti.,
Buyaka İki Sitesi, Kule 2, 34771, Ümraniye-İstanbul

Üretim Laboratuvarı: Zoetis Inc
2000 Rockford Road
Charles City, Iowa, ABD

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Pazarlama İzni Tarihi ve
No:14.02.2012 - 05144