



## Sadece Veteriner Kullanım İçindir



**Kompozisyonu:** Modifiye canlı *Canine distemper* virüsü N-CDV suşu ( $10^{3.5}TCID_{50}$ ), *Canine adenovirus* Tip 2 Manhattan suşu ( $10^{3.4}TCID_{50}$ ), *Canine parainfluenza* virüs NL-CPI-5 ( $10^{5.5}TCID_{50}$ ), *Canine parvovirus* NL-35-D ( $10^{7.2}TCID_{50}$ ) suşlarını ve inaktif *Leptospira grippotyphosa* MAL-1540 (600 neflometrik ünite/doz), *Leptospira canicola* C-51 (600 neflometrik ünite/doz), *Leptospira icterohaemorrhagiae* NADL 11403 (600 neflometrik ünite/doz), *Leptospira pomona* T262 (600 neflometrik ünite/doz) suşlarını içeren liyofilize kısım cam şişelerde ve alüminyum hidroksit (% 5 v/v) adjuvant içeren sulandırıcı kısım plastik şişelerde sunulmuştur. Koruyucu madde olarak gentamisin (< 30 mcg/ml) içermektedir.

**Endikasyonlar:** Altı haftalık ya da daha yaşlı köpeklerin *Canine distemper* virüsü tarafından oluşturulan Canine distemper (CD), *Canine adenovirus* Tip 1 (CAV-1) tarafından oluşturulan enfeksiyöz Canine hepatitisi (ICH), *Canine adenovirus* Tip 2 (CAV-2) tarafından oluşturulan solunum yolu hastalığı, *Canine parainfluenza* virüsü (CPI) tarafından oluşturulan *Canine parainfluenza*, *Canine parvovirus* tarafından oluşturulan Enteritis ve *Leptospira Canicola'* *L. grippotyphosa*, *L. icterohaemorrhagiae* ve *L. pomona* tarafından oluşturulan Leptospirosis'den korunmasında yardımcı olarak aşılmasında kullanılır.

**Doz ve uygulama yolu:** Liyofilize kısım aseptik jelin aseptik olarak ilavesi ile sulandırılır. İyice çalkalandıktan sonra kas içi ya da deri altı yolla 1 ml uygulanır. **Primer aşılama:** Sağlıklı köpekler 3 hafta ara ile 2 doz almalıdırlar. Potansiyel maternal antikor interferensinden etkilenmemek için 9 haftalık yaştan önce aşılama köpekler 3 hafta ara ile 3 doz uygulanmalıdır. **Tekrar aşılama:** Yıllık tek doz aşılama tavsiye edilmektedir. Bununla birlikte ilgili veteriner hekim hayvanın yaşam tarzına ve enfeksiyonlara maruz kalma riskine göre aşılama sıklığını belirlemelidir.

**Raf ömrü:** 2-7°C'ler arasında, 18 aydır.

**Saklama koşulları:** 2-7°C'ler arasında saklanmalıdır. Dondurulmamalıdır. Kullanım için sulandırılan aşı vakit geçirmeden uygulanmalıdır.

**Ambalaj şekli:** 25 doz aşı içeren plastik kutular içinde sunulmuştur. Her plastik kutuda lastik tıpalı 25'er adet liyofilize kısım içeren cam şişe ve sulandırıcı içeren plastik şişe bulunmaktadır.

**İmha şartları:** Kullanım sonrası aşı şişeleri yakılmak suretiyle inaktive edilmelidir.

**Pazarlama İzni Sahibi Adı ve Adresi:** Zoetis Hayvan Sağlığı Ltd. Şti., Buyaka İki Sitesi, Kule 2, 34771, Ümraniye-İstanbul

**Üretim Yeri:** Zoetis Inc., Lincoln, Nebraska, ABD

**T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Pazarlama İzni tarih ve No'su:** 13.07.2009 – 024921

**Kontrendikasyonları:** Gebe köpeklerde kullanılmamalıdır.

**Uyarılar:** Bu aşının etkili olduğu sağlıklı hayvanlarda gösterilmiştir. Hayvanlarda enfeksiyöz bir hastalık inkübasyon döneminde ise, yetersiz beslenme ya da paraziter enfeksiyon söz konusu ise, nakliye ya da çevresel şartlar yüzünden stres altında ve immunosupresyona uğramış iseler ya da aşılama önerildiği gibi uygulanmamış ise yeterli bağışıklık yanıtı oluşmayabilir.

**İstenmeyen etkileri:** Diğer aşılama da olduğu gibi uygulama sonrası anafaktik reaksiyon meydana gelebilir. Anafaktik reaksiyon meydana geldiğinde epinefrin ve muadilleri uygulanmalıdır.

**Diğer ürünlerle birlikte kullanım:** Bu aşının başka bir ürünle ile birlikte kullanımının ürünün güvenliği ve etkinliğine etkisine dair bir bilgi mevcut değildir. Diğer aşı ve immunolojik ürünlerle karıştırılmamalıdır.