

zoetis

Poulvac® TRT Vaccine

Sadece hayvan sağlığında kullanılır.



TANIM

Poulvac®TRT attenüe liyofilize, canlı bir aşı olup, Rhinotracheitis virüsü, clone K suşu (10^{3.2} TCID₅₀/doz) ve koruyucu madde olarak gentamisin içerir. Hindi palazlarına ve civcivlere uygulanır. Aşı G.M.P. gereksinimlerine uygun olarak üretilmiştir. Bu aşı suda eritilir.

ENDİKASYONLARI

Hindi palazlarında Rhinotracheitis (TRT) infeksiyonlarına karşı ve broilerlerde Rhinotracheitis virüs ile ilişkili solunum semptomlarına karşı aşılamada uygulanır.

DOZAJ, SULANDIRMA VE UYGULAMA

Dozaj:

Bir doz aşı; bir hindi palazına veya bir civcive sprey veya göz / burun damlatma yöntemi ile uygulanır.

AŞININ SULANDIRILMASI

Aşığı sulandırmadan ve uygulamadan önce "KONTRENDİKASYONLAR" ve "UYARILAR" bölümünü dikkatlice okuyunuz.

Aşı, kullanılmadan hemen önce sulandırılır. Terchen deiyonize su veya soğuk, temiz minimum klor ve metal iyonları içeren içme suyu kullanılır.

Sprey yöntemi:

El spreyi, sırt spreyi ve otomatik sprey ekipmanı

- Şişe açılır, şişenin yarısı su ile doldurulur, şişe çalkalanarak aşı eritilir, şişe içeriği su içine dökülür ve şişe çalkalanarak kalan içerik tamamen alınır. İyi bir karışım sağlamak için dikkatlice karıştırılır.

- Kullanılacak su miktarı, uygulama yöntemine, doz miktarına, kanatlıların yerleşim durumuna vb. bağlıdır. 1000 kanatlı aşılaması için pratik ölçüler: El spreyi için: 0.2 Litre

Sırt spreyi için: Eğer kanatlılar yerde ise 0.5 Litre, kanatlılar kafeste ise 0.25 Litre

Otomatik sprey ekipmanlı kuluçkahanelerde: 50 ml su kullanılır.

Göz / burun damla yöntemi:

- Aşı kullanılacak suda eritilir.
- Kullanılacak su miktarı, doz miktarına ve damla büyüklüğüne vb. bağlıdır. 1000 kanatlı aşılaması için pratik ölçüler: 0.05 ml damlacık büyüklüğü için 50 ml su kullanılır.

UYGULAMA

Sprey yöntemi:

El spreyi, sırt spreyi ve otomatik sprey ekipmanı (geniş damla sprey).

- Kanatlılar spreylenir (Sprey başlığı ve kanatlılar arasındaki mesafe 50 cm olmalıdır.) ve tüm kanatlıların aşığı direkt olarak alması sağlanmalıdır. Çapı 0.12 - 0.15 mm olan damlacık büyüklüğü kullanılmalıdır.

Göz / burun damlatma yöntemi:

- Aşı solüsyonu aşılama esnasında serin tutulmalıdır (örneğin eriyen buz üstünde).
- Damlalık her zaman aşı solüsyonu ile dolu olmalıdır.
- Bir göze veya bir burun deliğine bir damla aşı solüsyonu damlatılır.
- Kanatlının başı damlanın yuvarlanıp gitmesine mani olacak şekilde güvenli tutulmalıdır ve göz veya burun için damlatılan aşının emilmesi için yeterli süre olmalıdır.
- Aşılama sırasında hayvanın yutkunmasına izin verilmelidir.
- Burun damla aşılamasında bir burun deliği kapalı tutulmalı ve aşı inhale edilinceye kadar beklenmelidir.

AŞI PROGRAMI

Poulvac® TRT hindi palazlarına veya civcivlere bir günlük iken uygulanmalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR

Aşağıdakiler kontrendikedir:

- Hasta hayvanların aşılanması (acil durumda aşı yapılması hariç).

UYARILAR

YAN ETKİLER

Herhangi bir aşı, uygulama sonrası bazen lokal ve/veya genel reaksiyonlara yol açabilir. Bu reaksiyonlar genellikle geçicidir. Yanlış aşılama teknikleri bu konuda bir faktör olabilir.

UYGULAYICILAR YÖNÜNDEN GENEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu aşı insanlara uygulanmak için uygun değildir. Sprey kullanıldığı zaman, gözler koruyucu gözlükle, burun ve ağız toz maskesi ile korunmalıdır. Hava sirkülasyonu filtreli bir miğfer gözlükler ve maske yerine kullanılabilir.

GENEL ÖNLEMLER

Kanatlılar aşılama süresince stresten korunmalıdır. Aşı dondurulmamalı veya ısı ve/veya direkt güneş ışığından korunmalıdır. Dezenfektanlar aşırı etkisiz kılar. Temiz aşılama materyalleri kullanılmalıdır. Aşı artıkları dezenfeksiyonla tahrip edilmelidir. Materyaller atılmadan veya tekrar kullanılmadan önce dezenfekte edilmelidir. Sprey ekipmanı durulanmalı ve temiz su ile pompalanmalıdır. Dezenfeksiyon metodu olarak, sadece kalıntı bırakmayan yöntem kullanılmalıdır (örneğin, formal buharı (10 g KMnO₄, ısıya dayanıklı kap içinde 20 ml ticari formale katılır.) kapalı plastik torba içinde. İşlem sonrası eller yıkanır ve dezenfekte edilir. Aşı ve solüsyon için kullanılan materyaller ve uygulama çocuklardan uzakta tutulmalıdır.

İLAVE BİLGİLER

Bir sürüde az sayıda bireysel kanatlılar aşılama karşı hiç veya az reaksiyon gösterebilirler. İmmunolojik yanıt; genetik faktörler, subklinik infeksiyon, yaş, beslenme durumu, aynı anda yapılan ilaç sağıtım, stres vb. faktörler tarafından baskılanabilir. Aşılama sonucu aşının hatalı muhafazasına ve uygulanmasına bağlı olabilir.

Gebelik, laktasyon ve yumurtlamada kullanımı:

Yumurtlama dönemindeki kanatlıları aşılamayın.

Yasal Arınma Süresi: Sıfır gün.

RAF ÖMRÜ : 20 aydır.

Ambalajda bildirilen son kullanma tarihi, sadece aşının karanlıkta, şişenin açılmamış ve hasarsız olarak 2 °C - 8 °C'lerde saklanma durumunda geçerlidir.

Aşı dondurulmamalıdır.

Sulandırılan aşı, eğer oda ısısında veya altında saklanırsa sadece 2 saat için tutulabilir.

BU ÜRÜN GERİ ALINMAZ.

Üretim Laboratuvarı:

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.
Ctra. Camprodon s/n "La Riba"
17813 Vall de Bianya, Girona, Spain

Pazarlama İzin Sahibi Adı ve Adresi:

Zoetis Hayvan Sağlığı Ltd. Şti.,
Buyaka İki Sitesi, Kule 2, 34771,
Ümraniye-İstanbul

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NUMARASI:

22.03.2011 / 011943

zoetis

P1022-583TR/08-14